

SECOND DEGRÉ – Chapitre 2/2

▶ Tout le cours en vidéo : <https://youtu.be/tc9wvbYuZts>

Partie 1 : Résolution d'une équation du second degré

Définition : Une **équation du second degré** est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ où a , b et c sont des réels avec $a \neq 0$.

Exemple :

L'équation $3x^2 - 6x - 2 = 0$ est une équation du second degré.

Définition : On appelle **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$, le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$.

Propriété : Soit Δ le discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta < 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'a pas de solution réelle.

- Si $\Delta = 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a une unique solution : $x_0 = \frac{-b}{2a}$.

- Si $\Delta > 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Démonstration au programme :

▶ Vidéo <https://youtu.be/7VFpZ63Tgis>

On a vu dans « Second degré - Chapitre 1/2 » que la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous sa forme canonique :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \text{ avec } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Donc :

$ax^2 + bx + c = 0$ peut s'écrire :

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = 0$$

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a} = 0$$

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

car a est non nul.

- Si $\Delta < 0$: Comme un carré ne peut être négatif ($\frac{\Delta}{4a^2} < 0$), l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'a pas de solution.

- Si $\Delta = 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ peut s'écrire :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$$

L'équation n'a qu'une seule solution : $x_0 = \frac{-b}{2a}$

- Si $\Delta > 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à :

$$x + \frac{b}{2a} = -\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} \quad \text{ou} \quad x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}$$

$$x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{b}{2a} \quad \text{ou} \quad x = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{b}{2a}$$

$$x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

L'équation a deux solutions distinctes : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ ou $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

Méthode : Résoudre une équation du second degré

 Vidéo <https://youtu.be/youUIZ-wsYk>

 Vidéo <https://youtu.be/RhHheS2Wpyk>

 Vidéo <https://youtu.be/v6f12RqCCIE>

Résoudre les équations suivantes :

a) $2x^2 - x - 6 = 0$ b) $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$ c) $x^2 + 3x + 10 = 0$

Correction

a) Calculons le discriminant de l'équation $2x^2 - x - 6 = 0$:

$$a = 2, b = -1 \text{ et } c = -6 \text{ donc } \Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 49.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{49}}{2 \times 2} = -\frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{49}}{2 \times 2} = 2$$

b) Calculons le discriminant de l'équation $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$:

$$a = 2, b = -3 \text{ et } c = \frac{9}{8} \text{ donc } \Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times \frac{9}{8} = 0.$$

Comme $\Delta = 0$, l'équation possède une unique solution :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$$

c) Calculons le discriminant de l'équation $x^2 + 3x + 10 = 0$:


$$a = 1, b = 3 \text{ et } c = 10 \text{ donc } \Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 1 \times 10 = -31.$$

Comme $\Delta < 0$, l'équation ne possède pas de solution réelle.

Définition :

Pour une fonction polynôme f du second degré de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$, les solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ s'appellent les **racines** de f .

Remarque : Dans la pratique, une racine x_1 de f vérifie $f(x_1) = 0$. La courbe de f coupe l'axe des abscisses en x_1 .



Propriété : La somme S et le produit P des racines d'un polynôme du second degré de la forme $ax^2 + bx + c$ sont donnés par : $S = -\frac{b}{a}$ et $P = \frac{c}{a}$.

Méthode : Utiliser les formules de somme et produit des racines

▶ Vidéo [A venir bientôt](#)

Soit f la fonction polynôme du second degré définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = -2x^2 + x + 1$.

- 1) Montrer que $x_1 = 1$ est une racine de f .
- 2) Déterminer la deuxième racine.

Correction

1) x_1 est une racine si elle vérifie $f(x_1) = 0$.

$$f(x_1) = f(1) = -2 \times 1^2 + 1 + 1 = 0.$$

Donc x_1 une racine de f .

2) En utilisant le produit des racines, on a :

$$P = x_1 \times x_2 = 1 \times x_2 = x_2$$

$$\text{Et } P = \frac{c}{a} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Donc } x_2 = -\frac{1}{2}$$

Et donc f admet $x_2 = -\frac{1}{2}$ comme deuxième racine.

Partie 2 : Factorisation et signe d'un trinôme

1) Factorisation

Propriété : Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

- Si $\Delta = 0$: $f(x) = a(x - x_0)^2$, avec x_0 racine de f .

- Si $\Delta > 0$: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec x_1 et x_2 racines de f .

Remarque : Si $\Delta < 0$, il n'existe pas de forme factorisée de f .

Méthode : Déterminer les fonctions du second degré, s'annulant en deux nombres réels distincts

 **Vidéo** https://youtu.be/JiokX41_2nw

On considère la fonction polynôme f du second degré s'annulant en -1 et 2 et tel que $f(3) = -2$. Déterminer une expression factorisée de la fonction f .

Correction

• Comme la fonction f s'annule en -1 et 2 , on peut affirmer que -1 et 2 sont les racines de f .

Et donc : $f(x) = a(x - (-1))(x - 2) = a(x + 1)(x - 2)$.

• De plus, $f(3) = -2$

Donc : $a(3 + 1)(3 - 2) = -2$

$$a \times 4 \times 1 = -2$$

$$a = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

• On en déduit que : $f(x) = -\frac{1}{2}(x + 1)(x - 2)$.

Méthode : Factoriser un trinôme

 **Vidéo** <https://youtu.be/eKrZK1lisc8>

Factoriser les trinômes suivants : a) $4x^2 + 19x - 5$ b) $9x^2 - 6x + 1$

Correction

a) On cherche les racines du trinôme $4x^2 + 19x - 5$:

Calcul du discriminant : $\Delta = 19^2 - 4 \times 4 \times (-5) = 441$

Les racines sont : $x_1 = \frac{-19 - \sqrt{441}}{2 \times 4} = -5$ et $x_2 = \frac{-19 + \sqrt{441}}{2 \times 4} = \frac{1}{4}$

On a donc :

$$4x^2 + 19x - 5 = 4(x - (-5))\left(x - \frac{1}{4}\right) = 4(x + 5)\left(x - \frac{1}{4}\right).$$

b) On cherche les racines du trinôme $9x^2 - 6x + 1$:

$$\text{Calcul du discriminant : } \Delta = (-6)^2 - 4 \times 9 \times 1 = 0$$

$$\text{La racine unique est : } x_0 = -\frac{-6}{2 \times 9} = \frac{1}{3}$$



On a donc :

$$9x^2 - 6x + 1 = 9\left(x - \frac{1}{3}\right)^2$$



2) Signe d'un trinôme

Propriété : Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur \mathbb{R} par $f(x) = ax^2 + bx + c$.



- Si $\Delta < 0$: f ne possède pas de racine. Donc f ne s'annule pas.



- Si $\Delta = 0$: f possède une unique racine x_0 . Donc f s'annule en x_0 .



- Si $\Delta > 0$: f possède deux racines x_1 et x_2 . Donc f s'annule en x_1 et x_2 .



Méthode : Déterminer le signe d'un trinôme

▶ Vidéo <https://youtu.be/pT4xtl2Yg2Q>

▶ Vidéo <https://youtu.be/sFNW9KVtTMY>

▶ Vidéo <https://youtu.be/JCVotquzIIA>

Démontrer que la fonction polynôme f du second degré définie sur \mathbb{R} par $f(x) = 2x^2 + x + 4$ est positive.

Correction


Le discriminant de $2x^2 + x + 4$ est $\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times 4 = -31 < 0$

La fonction f ne possède pas de racine.

La parabole représentant f se trouve donc soit au-dessus de l'axe des abscisses, soit en dessous.

Comme $a = 2 > 0$, la parabole a les branches tournées vers le haut (en position « 😊 ») et donc elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses.

On en déduit que f est toujours positive.



Méthode : Résoudre une inéquation du second degré

▶ Vidéo <https://youtu.be/AEL4gKKNvp8>

Résoudre les inéquations : a) $x^2 - 2x - 15 < 0$
b) $x^2 + 3x - 5 < -x + 2$

Correction

a) Le discriminant de $x^2 - 2x - 15$ est $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-15) = 64$ et ses racines sont :

$$x_1 = \frac{2 - \sqrt{64}}{2 \times 1} = -3 \text{ et } x_2 = \frac{2 + \sqrt{64}}{2 \times 1} = 5$$

On obtient le tableau de signes : $a = 1 > 0$

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------|-----|-----------|---|
| x | $-\infty$ | -3 | 5 | $+\infty$ | |
| $x^2 - 2x - 15$ | + | 0 | - | 0 | + |

On lit dans le tableau de signes que $x^2 - 2x - 15 < 0$ pour $-3 < x < 5$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 2x - 15 < 0$ est donc $S =]-3 ; 5[$.

b) On commence par rassembler tous les termes dans le membre de gauche afin de pouvoir étudier le signe d'un trinôme :

$$x^2 + 3x - 5 < -x + 2$$

$$x^2 + 3x - 5 + x - 2 < 0$$

$$x^2 + 4x - 7 < 0.$$

Le discriminant de $x^2 + 4x - 7$ est $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 44$ et ses racines sont :

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{44}}{2 \times 1} = \frac{-4 - 2\sqrt{11}}{2} = -2 - \sqrt{11} \text{ et } x_2 = \frac{-4 + \sqrt{44}}{2 \times 1} = -2 + \sqrt{11}$$

On obtient le tableau de signes :

| | | | | | |
|--------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|
| x | $-\infty$ | $-2 - \sqrt{11}$ | $-2 + \sqrt{11}$ | $+\infty$ | |
| $f(x)$ | + | 0 | - | 0 | + |

On lit dans le tableau de signes que $x^2 + 4x - 7 < 0$ pour $-2 - \sqrt{11} < x < -2 + \sqrt{11}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 + 3x - 5 < -x + 2$ est donc :

$$S =]-2 - \sqrt{11}; -2 + \sqrt{11}[.$$

3) Application

Méthode : Étudier la position de deux courbes

 Vidéo <https://youtu.be/Eyxp5HIfyF4>

Soit f et g deux fonctions définies sur \mathbb{R} par : $f(x) = -x^2 + 8x - 11$ et $g(x) = x - 1$. Étudier la position relative des courbes représentatives C_f et C_g .

Correction

On va étudier le signe de la différence $f(x) - g(x)$:

$$f(x) - g(x) = -x^2 + 8x - 11 - x + 1 = -x^2 + 7x - 10.$$

Le discriminant du trinôme $-x^2 + 7x - 10$ est $\Delta = 7^2 - 4 \times (-1) \times (-10) = 9$

Le trinôme possède deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{-7 - \sqrt{9}}{2 \times (-1)} = 5 \text{ et } x_2 = \frac{-7 + \sqrt{9}}{2 \times (-1)} = 2$$

On dresse le tableau de signes du trinôme $-x^2 + 7x - 10$:


| | | | | | |
|---------------|-----------|---|---|-----------|---|
| x | $-\infty$ | 2 | 5 | $+\infty$ | |
| $f(x) - g(x)$ | - | 0 | + | 0 | - |

On conclut :

• $f(x) - g(x) \leq 0$, soit $f(x) \leq g(x)$ pour tout x de $]-\infty; 2] \cup [5; +\infty[$.

La courbe C_f est donc en-dessous de la courbe C_g pour tout x de $]-\infty; 2] \cup [5; +\infty[$.

• De même, la courbe C_f est au-dessus de la courbe C_g pour tout x de $[2; 5]$.



Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.

www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales