

# FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

– Chapitre 1/2

▶ Tout le cours en vidéo : <https://youtu.be/VJnsORfVWGg>



En 1614, un mathématicien écossais, *John Napier* (1550 ; 1617) ci-contre, plus connu sous le nom francisé de *Neper* publie « *Mirifici logarithmorum canonicis descriptio* ».

Dans cet ouvrage, qui est la finalité d'un travail de 20 ans, *Neper* présente un outil permettant de simplifier les calculs opératoires : le logarithme.

*Neper* construit le mot à partir des mots grecs « *logos* » (logique) et *arithmos* (nombre).

Toutefois cet outil ne trouvera son essor qu'après la mort de *Neper*. Les mathématiciens anglais *Henri Briggs* (1561 ; 1630) et *William Oughtred* (1574 ; 1660) reprennent et prolongent les travaux de *Neper*.

Les mathématiciens de l'époque établissent alors des tables de logarithmes de plus en plus précises.


L'intérêt d'établir ces tables logarithmiques est de permettre de substituer une multiplication par une addition (paragraphe II). Ceci peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais il faut comprendre qu'à cette époque, les calculatrices n'existent évidemment pas, les nombres décimaux ne sont pas d'usage courant et les opérations posées telles que nous les utilisons ne sont pas encore connues. Et pourtant l'astronomie, la navigation ou le commerce demandent d'effectuer des opérations de plus en plus complexes.

## Partie 1 : Fonction exponentielle et fonction logarithme

### 1) Rappels concernant la fonction exponentielle

**Propriétés :** La fonction exponentielle est définie, continue, dérivable, strictement croissante et convexe sur  $\mathbb{R}$ .

On a :  $(e^x)' = e^x$



**Propriétés :**

•  $e^0 = 1$        $e^1 = e$

•  $e^x > 0$

•  $e^{x+y} = e^x e^y$        $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$        $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$        $(e^x)^n = e^{nx}$ , avec  $n \in \mathbb{N}$


•  $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$        $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

## 2) Définition de la fonction logarithme népérien


La fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , à valeurs dans  $]0; +\infty[$ .

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, pour tout réel  $a$  de  $]0; +\infty[$  l'équation  $e^x = a$  admet une unique solution dans  $\mathbb{R}$ .

**Définitions :** • On appelle **logarithme népérien** d'un réel strictement positif  $a$ , l'unique solution de l'équation  $e^x = a$ . On la note  $\ln a$ .



• La **fonction logarithme népérien**, notée **ln**, est la fonction définie sur  $]0; +\infty[$ , par  $x \mapsto \ln(x)$




**Remarques :**

- Les fonctions  $exp$  et  $ln$  sont réciproques l'une de l'autre.

$exp$	1	2	0	$\ln(2)$	$ln$
	$e$	$e^2$	1	2	

- Les courbes représentatives des fonctions  $exp$  et  $ln$  sont symétriques par rapport à la droite d'équation  $y = x$ .



- Dans le domaine scientifique, on utilise la fonction logarithme décimale, notée **log**, et définie par :

$$\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln 10}$$

**Propriétés de ln liées à la fonction exp :**

- a) Pour  $x > 0$  :  $x = e^y \Leftrightarrow y = \ln(x)$
- b)  $\ln(1) = 0$  ;  $\ln(e) = 1$  ;  $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$
- c)  $\ln(e^x) = x$
- d) Pour  $x > 0$  :  $e^{\ln(x)} = x$

**Démonstrations :**

- a) Par définition
- b) -  $e^0 = 1$  donc d'après a, on a :  $\ln(1) = 0$   
 -  $e^1 = e$  donc d'après a, on a :  $\ln(e) = 1$   
 -  $e^{-1} = \frac{1}{e}$  donc d'après a, on a :  $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$
- c) Si on pose  $y = e^x$ , d'après a, on a :  $x = \ln(y) = \ln(e^x)$
- d) Si on pose  $y = \ln(x)$ , d'après a, on a :  $x = e^y = e^{\ln(x)}$

## Partie 2 : Propriétés de la fonction logarithme népérien

### 1) Relation fonctionnelle

**Théorème :** Pour tous réels  $x$  et  $y$  strictement positifs, on a :  $\ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y)$

**Démonstration :**

$$e^{\ln(x \times y)} = x \times y = e^{\ln(x)} \times e^{\ln(y)} = e^{\ln(x) + \ln(y)}$$

Donc :  $\ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y)$

**Remarque :** Voici comment Neper transformait un produit en somme :

Celui qui aurait, par exemple, à effectuer  $36 \times 62$ , appliquerait la formule précédente, soit :

$$\log(36 \times 62) = \log(36) + \log(62) \\ \approx 1,5563 + 1,7924 \text{ (à l'aide de la table ci-contre)}$$

L'addition étant beaucoup plus simple à effectuer que la multiplication, on trouve facilement :

$$\log(36 \times 62) \approx 3,3487$$

En cherchant à nouveau dans la table le logarithme égal à 3,3487, on trouve 2232, soit :  $36 \times 62 = 2232$ .

$x$	$\log(x)$
1	0
2	0,3010
3	0,4771
...	
34	1,5315
35	1,5441
36	1,5563
...	
62	1,7924
...	
2231	3,3485
2232	3,3487
2233	3,3489
...	

## 2) Conséquences

**Corollaires :** Pour tous réels  $x$  et  $y$  strictement positifs, on a :

$$a) \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$$

$$b) \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$$

$$c) \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2}\ln(x)$$

$$d) \ln(x^n) = n \ln(x), \text{ avec } n \text{ entier relatif}$$

$$\ln(\text{😂}) = \text{💧} \ln(\text{😂})$$

**Démonstrations :**

$$a) \ln\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(x) = \ln\left(\frac{1}{x} \times x\right) = \ln(1) = 0 \text{ donc } \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$$

$$b) \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln\left(x \times \frac{1}{y}\right) = \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$$

$$c) 2 \ln(\sqrt{x}) = \ln(\sqrt{x}) + \ln(\sqrt{x}) = \ln(\sqrt{x} \times \sqrt{x}) = \ln(x) \text{ donc } \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2}\ln(x)$$

d) On démontre ce résultat par récurrence le cas où  $n$  est un entier naturel.

L'initialisation est triviale.

La démonstration de l'hérédité passe par la décomposition :

$$\ln(x^{k+1}) = \ln(x^k \times x) = \ln(x^k) + \ln(x) = k \ln(x) + \ln(x) = (k+1) \ln(x)$$

**Méthode :** Simplifier une expression contenant des logarithmes

 **Vidéo** <https://youtu.be/HGrK77-SCI4>

Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \ln(3 - \sqrt{5}) + \ln(3 + \sqrt{5}) \quad B = 3 \ln(2) + \ln(5) - 2 \ln(3) \quad C = \ln(e^2) - \ln\left(\frac{2}{e}\right)$$

**Correction**

$$\begin{aligned} A &= \ln(3 - \sqrt{5}) + \ln(3 + \sqrt{5}) & B &= 3 \ln(2) + \ln(5) - 2 \ln(3) \\ &= \ln(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) & &= \ln(2^3) + \ln(5) - \ln(3^2) \\ &= \ln(9 - 5) = \ln(4) & &= \ln\left(\frac{2^3 \times 5}{3^2}\right) = \ln\left(\frac{40}{9}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \ln(e^2) - \ln\left(\frac{2}{e}\right) \\ &= 2 \ln(e) - \ln(2) + \ln(e) \\ &= 2 - \ln(2) + 1 = 3 - \ln(2) \end{aligned}$$

## 3) Équations et inéquations

**Propriétés :** Pour tous réels  $x$  et  $y$  strictement positifs, on a :

$$a) \ln(x) = \ln(y) \Leftrightarrow x = y$$

$$b) \ln(x) < \ln(y) \Leftrightarrow x < y$$

### Méthode : Résoudre une équation avec des logarithmes

 Vidéo <https://youtu.be/ICT-8ijhZiE>

- a) Résoudre l'équation  $e^{x+1} = 5$ .  
 b) Résoudre l'équation  $\ln(x) = 2$  dans l'intervalle  $I = ]0 ; +\infty[$ .  
 c) Résoudre l'équation  $\ln(x - 3) + \ln(9 - x) = 0$  dans l'intervalle  $I = ]3 ; 9[$ .

#### Correction

a)  $e^{x+1} = 5$

$$e^{x+1} = e^{\ln(5)}$$

$$x + 1 = \ln(5)$$

$$x = \ln(5) - 1$$

b) On résout l'équation dans l'intervalle  $I = ]0 ; +\infty[$ , car la fonction  $\ln$  est définie pour  $x > 0$ .

$$\ln(x) = 2$$

$$\ln(x) = \ln(e^2)$$

$$x = e^2$$

La solution est donc  $e^2$  car elle appartient à l'intervalle  $I = ]0 ; +\infty[$ .

c) On résout l'équation dans l'intervalle  $I = ]3 ; 9[$ , car  $x - 3 > 0$  et  $9 - x > 0$ .  
 Soit  $x > 3$  et  $x < 9$ .

$$\ln(x - 3) + \ln(9 - x) = 0$$

$$\ln(x - 3)(9 - x) = 0$$

$$\ln(x - 3)(9 - x) = \ln 1$$

$$(x - 3)(9 - x) = 1$$

$$-x^2 + 12x - 27 = 1$$

$$-x^2 + 12x - 28 = 0$$

$$\Delta = 12^2 - 4 \times (-1) \times (-28) = 32$$

$$x_1 = \frac{-12 + \sqrt{32}}{-2} = 6 - 2\sqrt{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-12 - \sqrt{32}}{-2} = 6 + 2\sqrt{2}$$

Les solutions sont donc  $6 - 2\sqrt{2}$  et  $6 + 2\sqrt{2}$  car elles appartiennent à l'intervalle  $I = ]3 ; 9[$ .

### Méthode : Résoudre une inéquation avec des logarithmes

 Vidéo [https://youtu.be/\\_fpPphstjYw](https://youtu.be/_fpPphstjYw)

a) Résoudre l'inéquation  $e^x + 5 > 4e^x$ .

b) Résoudre l'inéquation  $\ln(6x - 1) \geq 2$  sur l'intervalle  $I = \left] \frac{1}{6} ; +\infty \right[$ .

c) Résoudre dans un intervalle  $I$  à déterminer l'inéquation  $\ln(3 - x) - \ln(x + 1) \leq 0$ .

### Correction

$$\begin{aligned} \text{a) } e^x + 5 &> 4 e^x \\ e^x - 4 e^x &> -5 \\ -3 e^x &> -5 \\ e^x &< \frac{5}{3} \\ e^x &< e^{\ln\left(\frac{5}{3}\right)} \\ x &< \ln\left(\frac{5}{3}\right) \end{aligned}$$

L'ensemble solution est donc l'intervalle  $]-\infty ; \ln\left(\frac{5}{3}\right)[$ .

b) On résout l'inéquation dans l'intervalle  $I = \left] \frac{1}{6} ; +\infty \right[$ , car  $6x - 1 > 0$ . Soit  $x > \frac{1}{6}$ .

$$\begin{aligned} \ln(6x - 1) &\geq 2 \\ \ln(6x - 1) &\geq \ln(e^2) \\ 6x - 1 &\geq e^2 \\ 6x &\geq e^2 + 1 \\ x &\geq \frac{e^2 + 1}{6} \end{aligned}$$

L'ensemble solution est donc l'intervalle  $\left[ \frac{e^2 + 1}{6} ; +\infty \right[$  car il appartient à  $I = \left] \frac{1}{6} ; +\infty \right[$ .

c) Intervalle d'étude :

$\ln(3 - x)$  et  $\ln(x + 1)$  sont définis pour  $3 - x > 0$  et  $x + 1 > 0$ .

Soit :  $x < 3$  et  $x > -1$

L'inéquation est donc définie sur l'intervalle  $I = ]-1 ; 3[$ .

$$\begin{aligned} \ln(3 - x) - \ln(x + 1) &\leq 0 \\ \ln(3 - x) &\leq \ln(x + 1) \\ 3 - x &\leq x + 1 \\ 2 &\leq 2x \\ 1 &\leq x \end{aligned}$$

L'ensemble solution est donc  $] -1 ; 3[ \cap [ 1 ; +\infty [$  soit  $[ 1 ; 3[$ .



Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.

[www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales](http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales)